

تستجيب اللجنة الدولية للإغاثة (IRC) لأسوأ الأزمات الإنسانية، فهي تتقى المتضررين، وتعينهم على الأخذ بزمام حياتهم من جديد. تأسست اللجنة في عام 1933 بطلب من العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين بهدف إنقاذ اللاجئين الذين أجبروا على الفرار من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، كما أنها تعينهم على النهوض بحياتهم من جديد. وتعمل اللجنة في أكثر من 40 دولة، وفي 22 مدينة أمريكية حيث تعيد السلامة والكرامة والأمل لملايين النازحين من يكافحون من أجل البقاء. إن اللجنة الدولية للإغاثة تقود الطريق من اليأس إلى الأمل.



نيويورك

International Rescue Committee 122 East 42nd Street
New York, NY 10168-1289
USA

Rescue.org

توصيات لمقدمي الخدمات

لا يوجد أساس طبي لإجراء فحوص العذرية. وعليه فإن فحوص العذرية لا تصلح لتحديد ما إذا كانت المرأة عذراء أم لا. كما أن تلك الفحوص مضررة بالصحة. ونظرًا لكون هذه الفحوصات غير ضرورية طبياً، فمن غير الأخلاقي أن ينفذها أطباء وعاملون صحيون. **مقدم للخدمات الصحية يتبعي عليك أن:**

- تعرف على أحدث الأدلة وأفضل الممارسات وأن تتصرف بناء عليها. عليك أن تتحمل المسؤولية وأن تحمل زملائك مسؤولية تجنب الممارسات الضارة والمدفوعة ثقافياً لا طبياً. لا تجر فحص العذرية تحت أي ظرف من الظروف.

- تأكد من أن ضحايا الاعتداء الجنسي يتلقين الاحترام، وأنهن ينعمن بالحماية ضد وقوع المزيد من الأذى. إنك مسؤول عن توفير الرعاية السريرية ومعالجة الحالات الطبية، كما أنك مسؤول عن حالة المرضى إلى القطاعات الأخرى وأن تتعامل مع النتائج التي توصلت إليها وفقاً للمعايير الدولية بمهنية وسرية ورفاهة. يجب عليك ألا تقرر ما إذا كان ثمة اغتصاب قد وقع أم لا.

- قدم معلومات صحيحة للمرضى ولمقدمي الرعاية، ولا تعزز الممارسات الضارة. تواصل مع زملائك ومع المرضى بحرص واحترام، وقدم لهم المعلومات الطبية الدقيقة، بما فيها تبديد المعلومات المغلوطة. شارك في الحوار المفتوح وأخبر الجميع عن مسؤولياتك بوضوح.

- شارك في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول موضوع العذرية وغضاء البكارية من خلال البرامج التعليمية والبرامج الأبوية. إن طرح هذا الموضوع ضمن برامج الصحة الجنسية والإنجابية للمرأهقين سيؤدي إلى فهم أوسع وأكثر دقة لموضوع العذرية والخرافات المحيطة بممارس الجنس عند الإناث.

مقالات ذو الصلة:

- Olson, R. M., García-Moreno, C. (2017), Virginity testing: a systematic review Reproductive Health, vol 14:61.
- Mazoori, D. (2015), Virginity and Hymen Testing: No Factual, Scientific, or Medical Basis.
- Alempijevic, D et al. (2015), Statement on virginity testing; Independent forensic Expert Group.
- RFSU, (2010), Vaginal corona; Myths surrounding virginity – your questions answered.
- WHO. (2003), Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence.
- WHO. (2014), Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence; A clinical handbook.
- UNFPA, (2009), Partnering With Men To End Gender-Based Violence.

"بعد فحص العذرية انتهكوا لحقوق الإنسان. إنه مؤلم للغاية، وهو يضع مقدمي الخدمات في موقف حرج يعارض مسؤولياتهم الطبية، خصوصاً في ضوء العواقب السلبية التي يمكن أن يسببها الفحص. إن المخرج من ذلك كله هو تثبيط تلك الممارسات كلّياً".

أوغستين بالوكو، أخصائي سريري.

"اختبار العذرية يتعارض مع "قسم أبقراء" لمزاولة المهن الطبية ومع مبدأ لا ضرر ولا ضرار في الرعاية السريرية. كثيراً ما أتفكر في الصدمة العاطفية والجسدية التي تتعرض لها النساء والفتيات، وفي انعدام الخصوصية والثقة، وكذلك أتفكر في وصمة العار والأذى الجسدي التي تقع على الفتاة التي يظن أنها قد فقدت عذريتها. يجب ألا يكون للعاملين الصحيين دور في مثل هذه العملية."

ليليان كيابي، طبيبة ومستشارة فنية.

"إن العذرية فكرة اجتماعية وثقافية ودينية وأخلاقية، وليس لها تعريف طبي وعواقب قانونية معروفة في العالم الحديث. لا يوجد توصيف بيولوجي للعذرية ولا لفقدانها ولا لاستعادتها. إن مفهوم العذرية محاط بأغاليط كثيرة حول غشاء البكاره."

روبن نياورا، ضابط سريري.

ومن الصدمات النفسية التي تعاني منها الخاضعات لفحص العذرية على المدى الطويل: الفلق والاكتئاب وفقدان احترام الذات. كما يتسبّب الفحص بأنواع أخرى من العنف الجنسي والعزلة الاجتماعية.

وأخيراً، فقد تم تصنيف فحص العذرية القسري على أنه شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة، وقد يصنف أيضاً على أنه شكل من أشكال التعذيب. ومن منظور حقوقى، فإن فحص العذرية يعدّ تمييزاً جنسانياً، وعندما يتم الفحص قسراً فإنه يعدّ شكلاً من أشكال العنف الجنسي.

هل يمكن "ترقيع" غشاء البكاره جراحياً لاستعادة العذرية؟

تمارس جراحة غشاء البكاره على نطاق واسع على الرغم من كلفتها المرتفعة، وعلى الرغم من أنها لا تضمن وقوع النزيف عند الجماع لاحقاً. وأحياناً تسبب الجراحة المأ مزمناً. ويتم ترقيع غشاء البكاره في مرافق القطاع الخاص، ولا تحدث مطلقاً في مرفق عام ما لم يكن هناك مبرر طبي لها، وليس هناك ثمة مبرر.

بدلاً من اللجوء إلى الجراحة غير الضرورية ، يجب تقديم المشورة للنساء والفتيات اللواتي يبحثن عن الجراحة. وهذا يتضمن جلسات مع طبيب نسائي أو أخصائي اجتماعي أو أخصائي علاج طبيعي بهدف مناقشة مخاوف المريض، وتعزيز الثقة بالنفس ونفي الشعور بالعار. وحيث أن ذلك غالباً ما يتضمن إشراك أشخاص آخرين من تربطهم علاقة بالمرأة، فإنه من المهم تخصيص جلسات مع مستشار اجتماعي أو عامل اجتماعي لمعالجة المخاوف التي قد تواجه الفتيات بشأن العذرية، وذلك للحفاظ على سلامتها ولمعالجة السبب الجذري لسوء فهم المشكلة.

هل يدل فحص غشاء البكارة على وقوع اعتداء جنسي؟

من غير المبرر طيباً الاستدلال على وقوع اعتداء جنسي من خلال فحص غشاء البكارة. وفي المقابل فإن عدم وجود إصابة جسدية لا يدل على أن الاغتصاب لم يقع. إن الإيلاج القسري يضر كثيراً بالأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية. ولذلك فإن ضحايا الاعتداءات الجنسية يعاني من إصابات في الفرج والمهبل، إضافة إلى أجزاء أخرى من الجسد. وأحياناً فإن الإصابات قد تهدد حياة الضحية.

بعد تقديم الرعاية السريرية لضحايا العنف الجنسي، يطلب من مقدمي الخدمة التصديق على عذرية الضحية أو عدمها! مما يضع مقدم الخدمة في موقف صعب، فهو عالق بين مطالب أفراد العائلة ومتطلبات السلطات المحلية من جهة، والعمل على مصلحة الضحية من جهة أخرى، وذلك مع اعتبار المعايير الطبية التي تنص على أن اختبار العذرية لا يُعد تدخلاً طيباً مبرراً.

لائق مسؤولية إثبات وقوع الإساءة الجنسية أو الاغتصاب على عاتق مقدم الخدمة. فإن الاعتداء الجنسي بعد مسألة قانونية تتبعها المحاكم المختصة، وما لم يطلب من العامل الصحي تقديم شهادة مخصصة في المحكمة، فإن مسؤولية المقدم تقتصر على توثيق النتائج السريرية بدقة وموضوعية، وتقييم العلاج والرعاية بناء على التشخيص الطبي للمريض والنتائج السريرية. يجب على مقدمي الخدمات الابذوا بافتراضات أو استنتاجات أو حكم.

ما الذي ينتج عن فحص البكارة؟

الطريقتان الأكثر شيوعاً لفحص العذرية هما: 1) فحص الغشاء من حيث حجمه والتمزقات التي فيه 2) إدخال أصبعين في المهبل (ويُسمى "فحص الأصبعين"). والنظرية التي يبني عليها الفحصان هي أن مظهر الأعضاء التناسلية يمكن أن يثبت ما إذا كان الجماع قد وقع أم لا.

إن فحص الأعضاء التناسلية دون ضرورة يعرض النساء والفتيات إلى الكثير من العواقب الجسدية والنفسية والاجتماعية السيئة. أولاً، تنتهك تلك الفحوصات غير الضرورية سلام المرأة المفحوصة وخصوصيتها وكرامتها واستقلالها الذاتي. كما أنها تؤدي إلى زيادة التوتر والشعور بالصدمة، خصوصاً بالنسبة لضحايا العنف الجنسي. كما أن فحص العذرية يعتبر قسرياً طبيعته، وذلك لأن رفض الخضوع للفحص قد يفسر على أنه دليل على الذنب.


وثانياً، فإن نتائج فحص العذرية عاقد قانونية وجسدية وعاطفية واجتماعية، فإنها قد تحرم الفتاة من الزواج، ومن الحصول على فرص العمل، كما أن نتائج الفحص تنسحب في الشعور بالعار وجلب العار الأسرة والمجتمع. وتتسبب الفحوصات أيضاً في الحرمان من العدالة عند وقوع حالات الاغتصاب. وقد وقع أن انحررت بعض النساء عندما أثبتت "الفحص" أنهن لسن عذارى، وأخريات تم الاعتداء عليهن وقتلهن.

"إن الفحص الطبي للعذرية ليس عملاً أخلاقياً، وتعتبره منظمة الصحة العالمية من أعمال العنف الجنسي ضد السلامة الجنسية للمرأة. في رأيي، ينبغي أن يدرج الفحص ضمن الفحوصات الممنوعة طيباً.
روبن نياورا، ممرض

هل يمكن لغشاء البكاره أن يهتك؟

كغيره من الأنسجة البشرية، فإن النسيج المهبلي (بما في ذلك غشاء البكاره) يتضرر بسبب الإصابة. والحالات التي يشيع فيها التمزق المهبلي هي حالات الولادة وحالات العنف الجنسي. أما حينما تحدث تمزقات متاخرة الصغر في الغشاء فإن النسيج المهبلي ينزف قليلاً ولكنه يشفى بسرعة دون أن يترك التزيف أي أثر.

ويحتوى غشاء البكاره على القليل من الأوعية الدموية، والتي لا تزف كثيراً حينما يحدث تمزق للغضارب. كما يمكن أن يقع النزف عقب الاختراق المهبلي للمرة الأولى دون أن يلاحظ. وتشير الأبحاث إلى أن ما بين 40-63% من النساء والفتيات ينفين وقوع النزف بعد تجربتهن الجنسية الأولى. وفي المقابل فإن ما يزيد على 50% من اللاتي سبق لهن الجماع لم تتعرضن لأغشية بكارتهن للتمزق مطلقاً.



RFSU: حيضوت

لا يحتوى غشاء البكاره على نهايات عصبية. ولذلك فمن المرجح أن يكون الألم والتزيف أثناء الجماع ناتجين عن تمزقات في جدار المهبلي بسبب الإيلاج القسري أو عدم التريث، لا نتيجة لـ "ثقب" الغشاء.

أما في مرحلة ما قبل البلوغ، فإن غشاء البكاره وكذلك المهبلي يكونان أصغر حجماً وأقل مرونة. وبالتالي، يكون التمزق الناتج عن الإيلاج أكثروضوحاً. أما بالنسبة للنساء والمرأهقات، فإن غشاء البكاره يتمدد بما يسمح بالإيلاج المهبلي دون أي تمزق يذكر.

إن قلة من النساء تظهر في أغشية بكارتهن تغيرات بسبب الإيلاج. وفي تلك الحالات، فإن غشاء البكاره يتتعافى بشكل طبيعي في غضون أيام دون ظهور أية علامات على الإصابة.

من الصعب جداً حتى بالنسبة للأطباء ذوي الخبرة التفريق بين التشققات التي تظهر على غشاء البكاره الذي تم تعافيء، وبين التشققات السطحية التي تقع بشكل طبيعي على الغشاء. في الغالب لا توجد علاقة بين مظاهر غشاء البكاره وبين النشاط الجنسي للمرأة.

تعتبر العذرية موضوعاً حساساً وذو تاريخ معقد. وعلى الرغم من أن مسألة العذرية تتعلق بالجنسين إلا أن لعذرية الإناث أهمية أكبر لأنها ترتبط في الأذهان بسلوك الأخلاقي للأنثى، وبمدى طهارتها وتمسكها بشرفها، كما أنها ترتبط بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية المتدلولة، وبمدى صلاحية المرأة للزواج.


وكثيراً ما يطلب من مقدمي الخدمات الصحية فحص الفتيات غير المتزوجات للتأكد من عذرتهن، إما كفحص روتيني أو بعد تعرضهن لاعتداء جنسي. وأحياناً يجري الفحص لتحديد مدى أهلة المرأة للزواج، أو كشرط للتوظيف. كما أن للسلطات القضائية الحق في أمر المرأة بإجراء فحص البكاراة.

إن فحص العذرية يخلق حالة من الخوف لدى الإناث، ويتسرب في شورهن بالعارض، وهو وسيلة للمسيطرة على الرغبات الجنسية لدى الفتيات، ومعاقبتهن عليها. إنها ممارسة متجزرة في الممارسات التمييزية والذكورية. وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، فإن طلب إجراء الفحص يتعارض مع مسؤولياتهم المهنية والتي تستوجب احترام السرية والحصول على الموافقة المستبررة للمرأة.

خشاء البكاراة

غالباً ما يفترض أن خشاء البكاراة المهبلي، المعروف أيضاً باسم الإكليل المهبلي، هو الدليل على عذرية الأنثى، وتوجد العديد من الأساطير والمخايف المعلوطة التي تحاك حول خشاء البكاراة، والذي يظهر أن خشاء البكاراة ليست له وظيفة فسيولوجية محددة أو غرض معين، ويبعد أنه يظل كأحد مخلفات مرافق تطور الجنين.

يقع خشاء البكاراة على بعد 1 إلى 2 سم داخل فتحة المهبلي، ويُعدَّ جزء من الفرج والأعضاء التناسلية الخارجية، وهو ستابه في مادته لمادة المهبلي. ويبدو خشاء البكاراة على شكل إكليل متعرج من الأنسجة المخاطية المنطوية، ويكون أحواضاً مشوداً وفي أحوان آخر يكون مرتخياً. ويختلف خشاء البكاراة من حيث شكله وحجمه ولوئه ومرونته بحسب عمر الأنثى ومدى لاحاجتها الجسدي والتغيرات التي تقع لها إضافة إلى مستويات الهرمونات التي تفرزها.



أمثلة لمظهر خشاء البكاراة الطبيعي

ولا يوجد دليل طبي يؤيد الاعتقاد السائد بأن خشاء البكاراة يحدد ما إذا كان ثمة جماع قد وقع أم لا. بل إن العديد من الدراسات التي أجريت في دول مختلفة تتحقق بشكل لا لبس فيه فكرة أن خشاء البكاراة يصلح للاستدلال على الحالة العذرية.

المحتويات

العنبرية

غشاء البكارة

هل يمكن لغشاء البكاره أن يهتك؟

هل يستدل على وقوع اعتداء جنسي من خلال فحص غشاء البكاره؟

ما الذي يتربى على اجراء فحص البكاره؟

هل يمكن إعادة تثبيت غشاء البكاره جراحياً؟

توصيات لمقدمي الخدمات

مقالات ذات صلة

وضع هذا الكتيب من قبل فريق الصحة الإنجابية التابع للجنة الدولية للإغاثة (IRC). وعقب سنوات من التحدث مع مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية، فإننا نهدف إلى تفزيذ الأغاليط المتعلقة بالعنبرية النسائية، وإلى تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مقدمي الخدمات حول فحص العنبرية. وتستند المعلومات المقدمة في هذا الكتيب على الأدبيات المنشورة بشأن موضوعه، وعلى التوصيات الدولية بهذا الشأن.

تنتمي اللجنة الدولية للإغاثة بالشكر لموظفيها على مساهماتهم، كما تتقدم بالشكر لـ RFSU في السويد على إطلاعنا على الرسوم التوضيحية التي بحوزتهم.

يحق لأية جهة أن تستخدم هذا الكتيب. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على بريد: clinicalcare@iawg.net



مفاهيم خاطئة حول العُذرية

دليل مقدمي الخدمات الصحية

كانون ثاني/يناير 2018